

# Florentero Act pasta 15ml

**Marca:** Candioli

**Disponibilità:** Out Of Stock

**Peso:** 0.001



**Prezzo:** ~~18.00?€~~ 15.99?€

## Short Description

Mangime complementare in pasta per cani e gatti destinato a particolari fini nutrizionali. Può essere utilizzato durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi. Aiuta nella riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale con accresciuto livello di elettroliti a ingredienti ad elevata digeribilità.

## Descrizione

Mangime complementare in pasta per cani e gatti destinato a particolari fini nutrizionali. Può essere utilizzato durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi. Aiuta nella riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale con accresciuto livello di elettroliti a ingredienti ad elevata digeribilità.

## Componenti

Fruttoligosaccaridi, Oli e grassi vegetali (Olio di soia, Olio di girasole), Estratto di malto, Lieviti e prodotti simili (ottenuti da *Saccharomyces cerevisiae*), Mono e digliceridi di acidi grassi (Glicerol monostearato), Farina di riso (insilata), Proteina di siero di latte idrolizzata, Lignocellulosa (*Pinus Pinea*), Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali, Cloruro di sodio, Solfato di potassio, Fosfato bicalcico, Ossido di magnesio.

## Additivi per kg

*Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:*

Niacinamide 3a315 mg 19.200 – Vitamina B1 3a820 mg 2.500 – Vitamina B6 3a831 mg 800 - Vitamina B2 mg 640 - Vitamina E/alfa-tocoferil acetato racemico 3a700 UI 5.000.

*Emulsionanti, agenti stabilizzanti, addensanti e gelificanti:* Lecitine E322 mg 2.500.

*Stabilizzatore della flora intestinale:* *Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415

4b1707 (3,5x10<sup>10</sup> UFC/g) mg 16.200.

*Additivi tecnologici:* *Pediococcus Pentasaceus* DSM 12834 1k2103– *Lactobacillus brevis* DSM 12835 1k20710– *Lactobacillus Buchneri* DSM 12856 1k2075– *Lactobacillus Plantarum* DSM 12836 1k2078– *Lactobacillus Rhamnosus* NCIMB 30121 1k20711.

### **Modalità d'uso**

Si raccomanda di chiedere il parere del veterinario prima dell'uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego. Si raccomanda acqua a volontà. Il periodo di impiego raccomandato va da 1 a 2 settimane in ragione di 1 ml ogni 3,5 kg di peso corporeo al giorno. Suddividere la quantità giornaliera in due somministrazioni, al mattino ed alla sera.

### **Conservazione**

Validità a confezione integra: 24 mesi.

La data minima di conservazione si riferisce al prodotto confezionato integro e correttamente conservato.

Chiudere accuratamente il barattolo dopo l'apertura.

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di luce e di calore prima e dopo l'apertura.

### **Formato**

Siringa da 15 ml.